

ERITETAHRADESINFEKTIO

Yleistä	<p>Eritteet kuten veri, virtsa, maha-suolikanava-, haava- ja trakeeeritteet sisältävät usein paljon mikrobeja. Lattia-, kaluste- ja kosketuspinoilla eritetahrat toimivat mikrobien kasvualustana sekä aiheuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä infektoriskin. Henkilökunnan tulee poistaa eritetahra ja desinfioida kontaminoitunut alue heti sen havaittuaan. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan tulee huolehtia eritetahradesinfektiosta. Eritetahrojen poistoon tarvittavat välineet sijoitetaan yksikössä yhteisesti sovittuun paikkaan.</p>
Eritetahradesinfektioaineet	<p>Klorilli® (klooriyhdiste, kloramin-T) 1000 ppm käyttöliuos</p> <ul style="list-style-type: none">• Puhdas käyttöliuos säilyy kuukauden valmistuksesta. <p>Erisan Oxy+® (vetyperoksidi ja peretikkahappo) 2%</p> <ul style="list-style-type: none">• Puhdas 2% käyttöliuos säilyy yhden viikon valmistuksesta. <p>Oxivir Plus® (vetyperoksidi) 15% käyttöliuos</p> <ul style="list-style-type: none">• Puhdas käyttöliuos säilyy vuoden valmistuksesta. Kuitenkaan ylittämättä tiivisteessä olevaa viimeistä käyttöpäivämäärää.
Käyttöliuoksen valmistus ja säilytys	<p>Käyttöliuos valmistetaan yksikössä tarkoitusta varten nimikoituun annostelupulloon. Laimennos tehdään pakkauksen ohjeen mukaisesti.</p> <p>Laimennosta tehtäessä käytetään suojakäsineitä ja suojalaseja. Tarvittaessa roiskevaaran mukaan suojaesiliinaa.</p> <p>Käyttöliuoksen viimeinen käyttöpäivä merkitään annostelupulloon. Jos käytetään valmiita käyttöliuoksia, pulloon merkitään käyttöönottopäivä sekä voimassaoloaika avaamisen jälkeen.</p>
Kaksivaiheisen eritetahradesinfektion välineet	<ul style="list-style-type: none">• kertakäyttöisiä suojakäsineitä• alkoholipohjainen käsihuuhe• imeviä kertakäyttöpyyhkeitä• eritetahradesinfektioaine• roskapussi

Kaksivaiheinen eritetahradesinfektio	<ul style="list-style-type: none">• Desinfioi kädet.• Pue kertakäyttöiset suojakäsineet.• Imeytä erite ensin kertakäyttöpyyhkeeseen ja laita likainen pyyhe roskeen.• Lisää eritealueen päälle puhtaalla käsin kädellä desinfektioainetta.• Pyyhi pinta puhtaalla kertakäyttöpyyhkeellä ja laita pyyhe roskeen.• Riisu suojakäsineet roskapussiin.• Pese ja desinfioi kädet.• Vaikutusaika on pinnan pyyhintään ja kuivumiseen kulunut aika, jos ei muuta mainita.• Huolehdi, että erite ja poistamisessa käytettävät välineet eivät levitä mikrobeja edelleen.
Laajan alueen eritetahradesinfektio	Laajalla alueella olevien veri- ja eritetahrojen poistossa voidaan käyttää lattiakuivainta ja kertakäyttöisiä siivouspyyhkeitä. Eritteet poistetaan ensin lattiakuivaimella ja pinta pyyhitään desinfektioaineeseen kostutetuilla siivouspyyhkeillä.

Menettelyohje pohjautuu HUS Infektiosairauksien klinikan ohjeeseen.