

# Suojautuminen hengitystieinfektioilta asumispalveluyksiköissä

Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilökunta käyttää kaikessa lähikontaktissa kirurgista suu-nenäsuojainta, niin asukkaiden kuin muun henkilökunnan kanssa. Ruokaillessa noudatetaan turvavälejä tai ruokaillaan yksin. Sairaana ei tulla töihin.

Asukas, jolla ei tiedossa hengitystieinfektiota

Asukas, jolla hengitystieinfektion oireet

RSV

Covid19

Influenssa

Suojaimet

Tavanomaisten varotoimien mukaan. Roiskevaaratilanteissa suojaesiliina, suojakäsineet ja visiiri.

Kosketus- ja pisaravarotoimien mukaan. Kirurginen suu-nenäsuojain, visiiri, suojaesiliina, suojakäsineet. Voimakasoireisten asukkaiden kanssa ja aerosoleja tuottavissa toimenpiteissä FFP2/3 -hengityksensuojain.

Varotoimien kesto

Tavanomaiset varotoimet aina käytössä

Otetaan pocABRCV-näyte (22360). Jos negatiivinen, niin kunnes oireet helpottaneet

5-7vrk oireiden alusta

5-10vrk oireiden alusta, 2vrk lieväoireista ennen purkua

7vrk oireiden alusta tai 5vrk Tamiflu-lääkityksen aloituksesta

Käsihygienia

Kädet desinfioidaan ennen ja jälkeen asukkaan tai hänen lähiympäristönsä koskemisen, ennen aseptista toimenpidettä, eritteiden käsittelyn jälkeen sekä ennen suojakäsineiden pukemista ja riisumisen jälkeen. Kädet pestään vedellä ja saippualla wc-käynnin jälkeen, ennen ruokailua, kun kädet ovat näkyvästi likaiset sekä oksentavien ja ripuloivien asukkaiden hoitamisen jälkeen. Asukkaiden käsidesinfektio ohjatusti ennen ruokailua ja wc-käynnin jälkeen.

Yski ja niistä oikein

Yski hihaan, nenäliinaan tai kyynärtaipeeseen. Tämän jälkeen desinfioi kätesi. Niistä kertakäyttöiseen nenäliinaan, joka laitetaan roskeen heti käytön jälkeen. Desinfioi kätesi.