

# Suojautuminen hengitystieinfektioilta vuodeosastoilla

Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilökunta käyttää kaikessa lähikontaktissa kirurgista suu-nenäsuojainta, niin potilaiden kuin muun henkilökunnan kanssa. Ruokaillessa noudatetaan turvavälejä tai ruokaillaan yksin. Sairaana ei tulla töihin.

	Potilas, jolla ei tiedossa hengitystieinfektiota	Potilas, jolla hengitystieinfektion oireet	RSV	Covid19	Influenssa
Potilaan sijoittelu	Tavanomaisesti	1 hengen huone	1 hengen huone tai toisen RSV:n kanssa	1 hengen huone tai toisen covidin kanssa	1 hengen huone tai kohortti (A ja B erikseen)
Suojaimet	Tavanomaisten varotoimien mukaan. Roiskevaaratilanteissa suojaesiliina, suojakäsineet ja visiiri.	Kosketus- ja pisaravarotoimien mukaan. Kirurginen suu-nenäsuojain, visiiri, suojaesiliina, suojakäsineet. Voimakasoireisten kanssa FFP2/3 -hengityksensuojain.			
Varotoimien kesto	Tavanomaiset varotoimet aina käytössä	Otetaan pocABRCV-näyte (22360). Jos negatiivinen, niin kunnes oireet helpottaneet	5-7vrk oireiden alusta	5-10vrk oireiden alusta, 2vrk lieväoireista	7vrk oireiden alusta tai 5vrk Tamiflu-lääkityksen aloituksesta
Käsihygienia	Kädet desinfioidaan ennen ja jälkeen potilaan tai hänen lähiympäristönsä koskemisen, ennen aseptista toimenpidettä, eritteiden käsittelyn jälkeen sekä ennen suojakäsineiden pukemista ja riisumisen jälkeen. Kädet pestään vedellä ja saippualla wc-käynnin jälkeen, ennen ruokailua, kun kädet ovat näkyvästi likaiset sekä oksentavien ja ripuloivien potilaiden hoitamisen jälkeen. Potilaiden käsidesinfektio ohjautusti ennen ruokailua ja wc-käynnin jälkeen.				
Yski ja niistä oikein	Yski hihaan, nenäliinaan tai kyynärtaipeeseen. Tämän jälkeen desinfioi kätesi. Niistä kertakäyttöiseen nenäliinaan, joka laitetaan roskeen heti käytön jälkeen. Desinfioi kätesi.				