

Suojautuminen moniresistenteiltä mikrobeilta vuodeosastoilla

Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilökunta käyttää kaikessa lähikontaktissa kirurgista suu-nenäsuojainta, niin potilaiden kuin muun henkilökunnan kanssa.

Potilas, jolla ei tiedossa moniresistenttiä mikrobia

ESBL E. Coli -kantaja

ESBL Klebsiella pneumoniae -, CPE-, MRSA-, VRE-, AcinMDR- ja PseuMDR-kantaja

Candida auris -kantaja

Potilaan sijoittelu

Tavanomaisesti

Tavanomaisesti. Riskiosastoilla (teho, valvonta, hematologian ja onkologian osastot) 1 hengen huone.

1 hengen huone. Oma wc mahdollisuuksien mukaan.

1 hengen huone. Oma wc mahdollisuuksien mukaan.

Suojaimet

Tavanomaisten varotoimien mukaan. Roiskevaaratilanteessa suojaesiliina, suojakäsineet ja visiiri.

Tavanomaisten varotoimien mukaan. Riskiosastoilla ja alle 7-vuotiaat kosketusvarotoimin; suojaesiliina ja suojakäsineet.

Kosketusvarotoimien mukaan. Suojaesiliina ja suojakäsineet. Tarvittaessa roiskevaaran mukaan visiiri.

Varotoimien kesto

Tavanomaiset varotoimet aina käytössä

Jos näytteet negatiiviset, yhteys hygieniahoitajaan.

Jos näytteet negatiiviset, yhteys hygieniahoitajaan, joka arvioi kantajuuden purun. Purkamiseen tarvitaan useita eri aikaan otettuja näytteitä.

Käsihygienia

Kädet desinfioidaan ennen ja jälkeen potilaan tai hänen lähiympäristönsä koskemisen, ennen aseptista toimenpidettä, eritteiden käsittelyn jälkeen sekä ennen suojakäsineiden pukemista ja riisumisen jälkeen. Kädet pestään vedellä ja saippualla wc-käynnin jälkeen, ennen ruokailua, kun kädet ovat näkyvästi likaiset sekä gastroenteriittipotilaiden hoitamisen jälkeen. Potilaiden käsidesinfektio ohjatusti ennen ruokailua ja wc-käynnin jälkeen.

Kuin edellä, mutta lisäksi kädet pestään potilaan hoitamisen jälkeen vedellä ja saippualla.