

Suojautuminen vatsataudeilta vuodeosastoilla

Potilas, jolla vatsataudin oireet

Clostridium Difficile

Norovirus

Potilaan sijoittelu

1 hengen huone. Oma wc mahdollisuuksien mukaan.

1 hengen huone. Oma wc mahdollisuuksien mukaan.

1 hengen huone tai toisen noropotilaan kanssa kohortissa.

Suojaimet

Tavanomaisten varotoimien lisäksi kosketusvarotoimet. Suojaesiliina, suojakäsineet. Roiskevaaratilanteessa kirurginen suu-nenäsuojain ja visiiri.

Varotoimien kesto

Kiireellisissä tapauksissa tutkitaan F-CldNhOK (21865) ja F-NoroNhO (4940). Kiireettömissä tapauksissa tutkitaan F-CldTNhO (6141) ja F-NoroNhO (4940). Varotoimet kunnes näytevastaukset saatavilla tai kaksi oireetonta vuorokautta.

Varotoimet kunnes kaksi oireetonta vuorokautta.

Altistuneet

Tavanomaiset varotoimet. Oireettomat altistuneet pyritään siirtämään erilleen oireilevasta. Jos oireita ilmenee, toimitaan yllä olevien ohjeiden mukaan.

Altistuneet siirretään erilleen oireilevasta. Kosketusvarotoimet, kunnes kaksi oireetonta vuorokautta. Altistuneet voidaan kohortoida.

Käsihygienia

Kädet desinfioidaan ennen ja jälkeen potilaan tai hänen lähiympäristönsä koskemisen, ennen aseptista toimenpidettä, eritteiden käsittelyn jälkeen sekä ennen suojakäsineiden pukemista ja riisumisen jälkeen. Kädet pestään vedellä ja saippualla gastroenteriittipotilaiden hoitamisen jälkeen, wc-käynnin jälkeen, ennen ruokailua sekä kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Potilaiden käsien desinfektio ohjatusti ennen ruokailua ja wc-käynnin jälkeen.