

ASEPTIIKKA PERIFEEERISEN LASKIMOKANYYLIN LAITOSSA

Kanyylin ja pistopaikan valinta	<p>Valitse käyttötarkoitukseen soveltuva, mahdollisimman pieni turvakanyyli.</p> <p>Harkitse pistopaikkaa. Suositeltava kohta on ei-dominoivan yläraajan kämmenselkä tai kyynärvarsi. Taivekohtien kanylointiin liittyy suurentunut infektioriski.</p>
Valmistelu	<p>Desinfioi kädet ja kerää tarvittavat välineet pesevällä pintadesinfektioaineella/-liinalla puhdistetulle toimenpidepöydälle.</p>
Kanyylin laittaminen	<ul style="list-style-type: none">• Desinfioi kädet.• Etsi suoni ja laita staasi potilaalle.• Puhdista iho ihon desinfektioaineella (Alkoholi 12t 80 %) yhdensuuntaisin vedoin sidosten alle jäävältä alueelta ja anna sen kuivua. Pistokohtaan ei enää kosketa.• Desinfioi kädet ja laita tehdaspuhtaat suojäkäsineet.• Kanyloi suoni ja löysää staasi. Testaa suoniyhteys.• Laita käytetty neula suoraan neulankeräysastiaan.• Kiinnitä kanyyli huolellisesti steriilillä ”ikkunallisella” suojakalvolla, jotta juuri on nähtävissä. Älä koske kalvon sisäpintaan.• Kanyylin päähän asetetaan neulaton liitin, johon voidaan tarvittaessa liittää infuusioletku.• Riisu suojäkäsineet ja desinfioi kädet.• Samalla kanyylilla ei saa pistää toista kertaa, vaan jokainen kanylointiyritys tehdään aina uudella puhtaalla kanyylillä.
Kirjaaminen	<p>Kirjaa LifeCaren Hoitotoimenpiteet-lomakkeelle kanyylin koko, asettamisen ajankohta ja asetuspaikka.</p>

Ohje pohjautuu HUS Infektiosairauksien klinikan ohjeeseen.