

KILPIRAUHASEN GAMMAKUVAUS

Yleistä

Tutkimuksella selvitetään kilpirauhasen kokoa, rakennetta ja aktiivisuutta.

Varaa tutkimukseen noin 2 tuntia aikaa.

Tutkimuspäivänä saat syödä ja juoda normaalisti.

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

Lääkkeet

Seuraavat lääkkeet tulee tauottaa:

- Thyroxin-lääkitys 4 viikkoa ennen tutkimusta
- Tyrazol-lääkitys 2 vuorokautta ennen tutkimusta

Saat ohjeet hoitavalta lääkäriltäsi.

Tutkimus

Sinulle laitetaan käsivarteen laskimokanyyli, jonka kautta verenkiertoosi ruiskutetaan radioaktiivista merkkiainetta.

Kuvaus aloitetaan noin 30 minuuttia merkkiaineen antamisen jälkeen. Se kestää noin 35 minuuttia. Tutkimuksen yhteydessä voidaan tehdä myös elimistön rakenteita kuvaava TT-kuvaus (tietokonetomografia), jonka avulla kilpirauhanen pystytään paikantamaan tarkasti.

Kuvaus tehdään makuuasennossa ja se on kivuton.

Tutkimuksen jälkeen

Juo runsaasti nestettä ja tyhjennä virtsarakkosi tavallista useammin tutkimuksen jälkeen.

Jos imetät, pidä 4 tunnin imetystauko, jonka päätteeksi lypsä kertynyt maito ja kaada se viemäriin.

Saatuasi radioaktiivisen merkkiaineen vältä lasten sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Huomioitavaa

Jos epäilet olevasi raskaana, ilmoita siitä henkilökunnalle. Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville henkilöille.

Tutkimuksen tulokset saat sinua hoitavasta yksiköstä.

Sijainti:	Hyväksytty pvm: 19.2.2024
Hyväksyjä: el Jyri Toikka	Laatija: rh Noa Harju

Yhteystiedot

Säteilyyn tai tutkimukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Kymenlaakson isotooppiyksikköön arkisin klo 8-15.

Lääkkeisiin ja sairaslomatodistuksiin liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä lähettävään yksikköösi.

Sijainti:	Hyväksytty pvm: 19.2.2024
Hyväksyjä: el Jyri Toikka	Laatija: rh Noa Harju