

8.3.2024

Syyhyn lääkehoito

Syyhyinfektion hoitoon on 3 erivaihtoehtoa

Permetriinivoide (NIX 5%) 2 hoitokertaa 7-10 päivän välein (hoitaa noin 50 % infektioista).

Vaihtoehtoisesti **rikki-vaseliini voidehoito** (hoitovaste oletettavasti parempi kuin NIX voiteella)

Rikkivaseliini laitetaan illalla ja pestään pois aamulla. Kolmen päivän ajan ja toistetaan 7-10 päivän kuluttua.

Kirjoitetaan ex-tempore valmisteena. LC:ssa on olemassa valmis ex tempore pohja "rikki 10%-vaseliini, voide". Resepti muutetaan, jos kyseessä on lapsipotilas 6%-vaseliini voide ja vaikuttavan aineen Sulfur määrä on 6.0.

Hoito voidaan aloittaa myös suoraan **ivermektiini 3 mg po tablettihoidolla** painokilojen mukaan kerta-annoksena ja hoito toistetaan 7-10 vrk kuluttua

Ensimmäisen hoidon epäonnistuessa voidaan käyttää kombinaatiohoitona: ivermektiini 3 mg p.o. painoon suhteutettuna + 10%:n rikki-vaseliinia aikuissilla ja 6% rikki-vaseliinia lapsilla. (vaihtoehtona NIX 5%)

Hoito toteutetaan **2 kertaa** 7-10 pv välein ja koskee kaikkia valmisteita.

Potilaan kaikki lähikontaktit hoidetaan samalla tavalla ja samaan aikaan.

RESEPTIN MUKANA POTILAALLE ANNETAAN MYÖS KIRJALLISET HOITO-OHJEET JOSSA MM. SIIVOUSOHJEET