

# Atsatiopriini-lääkeohje

## 1. Yleistä

Atsatiopriini on vaikutusmekanismiltaan immunosuppressantti, eli se rauhoittaa kehon puolustusjärjestelmää. Sitä käytetään tulehduksellisten keuhkokudoksen sairauksien hoidossa. Atsatiopriinihoidon yhteydessä käytetään usein myös pientä annosta kortisonia (prednisoloni) ja joskus se voidaan yhdistää toiseen puolustusjärjestelmää alentavaan lääkkeeseen. Lääkkeen teho alkaa ja loppuu hitaasti tavallisesti noin 3 kuukaudessa.

Atsatiopriinin valmist nimiä ovat mm. **Azamun** ja **Imurel**.

## 2. Hoidon käytännön toteutus

Lääkehoidon aloitus suunnitellaan yleensä lääkärin vastaanottokäynnillä. Lääkäri kertoo hoidon tavoitteista, haitoista ja annoksesta. Ennen hoidon aloitusta sinulle varataan keuhkohoitajan ohjauskäynti.

**Älä aloita lääkettä ennen kuin olet saanut luvan joko lääkäriltä tai keuhkohoitajalta.**

Lääkeannos on yksilöllinen ja sen päättää hoitava lääkäri. Lääkitys aloitetaan tyypillisesti pienellä annoksella ja nostetaan (eli titrataan) pikkuhiljaa verikokeita ja vointia seuraten. Tablettivahvuudet ovat 25 ja 50 mg. Tavoiteannos on 1,5-2 mg/kg/vrk. Lääke otetaan runsaan nesteen kanssa 1 tai 2 kertaa päivässä aterian yhteydessä

Lääkehoitoa aloitettaessa ja annosmuutosten jälkeen otetaan tyypillisesti verikokeet 3, 6 ja 12 viikon kuluttua ja sen jälkeen 3-6 kk välein. Hoitava lääkäri päättää verikoeseurannasta

## 3. Haittavaikutukset

Atsatiopriini-hoitoon voi liittyä haittavaikutuksia. Tämän vuoksi sinua seurataan tiiviisti keuhkosairauksien poliklinikalla.

Tyypillisimpiä mahdollisia haittavaikutuksia ovat:

- Pahoinvointi ja vatsavaivat
- Joskus nähdään veren kuvan muutoksia
- Maksaärsytys on kohtalaisen yleistä, mutta harvoin vakavaa
- Bakteeri- ja virusinfektiot voivat lisääntyä atsatiopriini-hoidon aikana

Sijainti: Keuhkosairaudet	Hyväksytty pvm: 28.8.2023
Hyväksyjä: Jukka Viikari, osastonylilääkäri	Laatija: Ville Koistinen, keuhkosairauksien ylilääkäri

- Pitkäaikaiskäytössä atsatiopriini voi lisätä jonkun verran imukudos ja-ihosyöpien riskiä, mutta yleisesti ottaen lääkkeen hyöty ylittää riskin.

#### 4. Hoidossa huomioitavaa

Mikäli sinulle kehittyy atsatiopriini-hoidon yhteydessä merkittäviä oireita (pahenevaa yskää tai hengenahdistusta, vaikeita vatsakipuja, lämpöilyä), ota yhteyttä keuhkosairauksien poliklinikalle.

Atsatiopriini tulee tauottaa mikrobilääkehoitoa vaativan infektiotaudin yhteydessä mikrobilääkehoidon ajaksi.

Mikäli sinulle kehittyy kuumeinen infektio, on sinun hakeuduttava kiireellisesti lääkärin vastaanotolle (terveysasema, työterveyshuolto, päivystys).

Ennen hoidon aloitusta sinun tulee huolehtia jäykkäkouristus, hinkuyskä, kurkkumätärokotustehostuksista. Pneumokokkrokotusta, kausi-influenssarokotusta sekä koronarokotuksia suositellaan otettavaksi.

Eläviä, mutta heikennettyjä rokotuksia (keltakuume) voidaan antaa, jos käytössä ei ole muita puolustusjärjestelmään vaikuttavia lääkkeitä.

Atsatiopriinia voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Atsatiopriinia ei tule käyttää samanaikaisesti kihdin hoitoon tarkoitetun allopurinolin kanssa.

Suojaudu lääkehoidon aikana hyvin auringolta. Luomia tulee seurata ja epäilyttävät poistaa.

#### 5. Yhteystiedot

Lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä tai mikäli haittaoireita ilmenee, ole yhteydessä keuhkosairauksien poliklinikalla puhelimitse (puh. 05 220 2403, kello 8-15).

Sijainti: Keuhkosairaudet	Hyväksytty pvm: 28.8.2023
Hyväksyjä: Jukka Viikari, osastonylilääkäri	Laatija: Ville Koistinen, keuhkosairauksien ylilääkäri