

Infliksimabi-lääkehoito

1. Yleistä

Infliksimabi on vaikutusmekanismiltaan immunosuppressantti, eli se rauhoittaa kehon puolustusjärjestelmää estämällä tuumorinekroositekijä α -nimistä välittäjäainetta (TNF- α).

Sitä käytetään tulehduksellisten keuhkokudoksen sairauksien hoidossa, mutta myös muiden eliryhmien tulehduksellisissa sairauksissa. Infliksimabi-hoidon yhteydessä käytetään yleensä myös metotreksaattia. Lääkkeen teho alkaa ja loppuu hitaasti tavallisesti noin 3 kuukaudessa.

Infliksimabi kaupanimia ovat mm. Inflectra, Remicade, Remsima ja Zessly.

2. Hoidon käytännön toteutus

Lääkehoidon aloitus suunnitellaan lääkärin vastaanottokäynnillä. Lääkäri kertoo hoidon tavoitteista, haitoista ja annoksesta. Ennen hoidon sinulta otetaan hoidon turvallisuutta mittaavia laboratoriotestejä. Hoito annetaan hoitokeskuksessa, jossa hoitaja ohjaa lääkkeen käytön.

Hoito annetaan tiputuksena suonensisäisesti Hoitokeskuksessa. Annos määritellään aina yksilöllisesti, mutta se on usein 3-5 mg/kg/ viikoilla 0, 2, 6 ja 12 ja sen jälkeen esim. 8-16 viikon välein.

Lääkehoitoa aloitettaessa ja ennen jokaista lääketiputusta otetaan verestä täydellinen verenkuvat (TVK), maksakokeet (Alat), munuaisarvo (Krea) ja tulehduksen arvo (CRP). Hoitava lääkäri päättää verikoeseurannasta.

3. Haittavaikutukset

Infliksimabiin voi liittyä haittavaikutuksia. Tämän vuoksi sinua seurataan tiiviisti keuhkosairauksien poliklinikalla.

Typillisimpiä mahdollisia haittavaikutuksia ovat:

- Kutina, päänsärky ja vilunväristykset tiputuksen yhteydessä. Oireet ovat yleensä lieviä. Harvemmin allergisia reaktioita.
- Lääke voi lisätä virus- ja bakteeri-infektioiden riskiä, eikä lääkettä tule antaa infektion aikana.

| | |
|---|--|
| Sijainti: Keuhkosairaudet | Hyväksytty pvm: 28.8.2023 |
| Hyväksyjä: Jukka Viikari, osastonylilääkäri | Laatija: Ville Koistinen, keuhkosairauksien ylilääkäri |

4. Hoidossa huomioitavaa

Mikäli sinulle kehittyy infliksimabi-hoidon yhteydessä merkittäviä oireita (pahenevaa yskää tai hengenahdistusta, vaikeita vatsakipuja, lämpöilyä), ota yhteyttä keuhkosairauksien poliklinikalle.

Infliksimabi-hoito tulee tauottaa mikrobilääkehoitoa vaativan infektioaudin yhteydessä mikrobilääkehoidon ajaksi.

Mikäli sinulle kehittyy kuumeinen infektio, on sinun hakeuduttava kiireellisesti lääkärin vastaanotolle (terveysasema, työterveyshuolto, päivystys) ja kerrottava infliksimabi-hoidosta terveydenhuollon ammattilaiselle.

Ennen hoidon aloitusta sinun tulee huolehtia jäykkäkouristus, hinkuyskä, kurkkumätärokotustehostuksista. Pneumokokkrokotusta, kausi-influenssarokotusta sekä koronarokotuksia suositellaan otettavaksi.

Eläviä, mutta heikennettyjä rokotuksia ei tule Infliksibaihoidon aikana.

Leikkaushoito tulisi ajoittaa kahden infliksimabi-tiputuksen väliin. Hoitoa saa jatkaa vasta kun leikkaushaavat ovat parantuneet hyvin.

Raskauden aikainen infliksimabin käyttö arvioidaan yksilöllisesti. Infliksimabia voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

5. Yhteystiedot

Lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä tai mikäli haittaoireita ilmenee, ole yhteydessä keuhkosairauksien poliklinikalla puhelimitse (puh. 05 220 2403, kello 8-15).

| | |
|---|--|
| Sijainti: Keuhkosairaudet | Hyväksytty pvm: 28.8.2023 |
| Hyväksyjä: Jukka Viikari, osastonylilääkäri | Laatija: Ville Koistinen, keuhkosairauksien ylilääkäri |