

Solunsalpaajan joutuminen kudokseen

1. Yleistä

- Solunsalpaaja voi kaikista varotoimista huolimatta joutua suonen ulkopuolelle kudokseen. Tätä tapahtumaa kutsutaan ekstravasaatioksi.
- Ekstravasaatio aiheuttaa paikallista kipua, turvotusta ja punoitusta. Osa solunsalpaajista aiheuttaa vaikeita kudonvaurioita. Kudonvaurio voi jatkaa kehittymistään useita viikkoja.
- Kudonvaurioiden vakavuutta ei pystytä ennustamaan. Vaurioalueelle voi ilmaantua rakkuloita ja käden toimintakyky voi heikentyä. Vaikeimmissa tilanteissa saatetaan joutua kirurgisiin toimenpiteisiin.

2. Vastalääke

- Tietyille solunsalpaajille on olemassa vastalääke, joka vähentää kudonvaurioita.
- Vastalääke annetaan laskimoon kolmena peräkkäisenä päivänä. Ensimmäinen tiputus annetaan ekstravasaation toteamisen jälkeen. Veriarvojen seurataan, koska annettu solunsalpaaja ja vastalääke laskevat veriarvoja.
- Vastalääke voi aiheuttaa pahoinvointia, johon voi ottaa pahoinvoinnintolääkitystä tarpeen mukaan.

3. Ihon hoito

- Ekstravasaatiota hoidetaan kotona kuten palovammaa.
- Iho rasvataan vuorotellen perusvoiteella, miedolla kortisonivoiteella ja Bepanthen- voiteella useita kertoja päivässä. Iho suojataan auringolta. Vältä käden rasittamista ja kiristäviä hihoja.
- Jos kuume nousee yli 38 asteen tai iholle ilmaantuu rakkuloita, ota yhteyttä virka-aikana omaan keuhkolääkehoitajaan tai hakeudu sairaalapäivystykseen.

4. Yhteystiedot

- Mikäli sinulle tulee kysyttävää hoidosta, tai hoito aiheuttaa haittavaikutuksia, ole yhteydessä keuhkosairauksien poliklinikalle arkisin kello 8-15.
 - Keuhkolääkehoitajan puhelin: **05 220 2435**
 - Sihteerin puhelin: **05 220 2403**
- Mikäli voitisi heikkeneä äkillisesti tai sinulle tulee kuumetta yli 38 astetta, hakeudu päivystykselliseen arvioon lähimpään päivystävään sairaalaan
- Häätätapauksissa soita 112.

Sijainti: Keuhkosairauksien poliklinikka	Hyväksytty pvm: 27.2.2024
Hyväksyjä: Maija Peippo	Laatija: Ville Koistinen