

Etoposidi-karboplatiini syövän hoitoon

1. Yleistä

- Etoposidi-karboplatiini-hoito on tarkoitettu pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon. Se koostuu 2 solunsalpaajasta nimeltään etoposidi ja karboplatiini.
- Solunsalpaajat estävät eri tavoin syöpäsolujen kasvua tai jakautumista.
- Haittavaikutukset johtuvat lääkkeiden vaikutuksen kohdistumisesta myös terveisiin soluihin. Sivuvaikutukset vaihtelevat yksilöllisesti ja korjaantuvat yleensä ajan myötä solunsalpaajahoidon päättyttyä.

2. Hoidon toteutus

- Ennen jokaista hoitokertaa otetaan laboratoriotulokset, joiden tulokset lääkäri tai hoitaja tarkistaa, että ne ovat kunnossa hoitoa varten.
- Hoito annetaan hoitokeskuksessa yleensä 3 viikon välein.
- Hoitopäivänä 1 lääkkeet annetaan hoitokeskuksessa suonen sisäisesti. Seuraavana kahtena päivänä etoposidi-tabletit (Vepesid) otetaan suun kautta. Lääkäri on kirjoittanut sytostaattitableteista erillisen reseptin, ks. **Taulukko 1**.
- Ensimmäisen hoidon yhteydessä lääkärin arvion mukaan yksilöllisesti liitetään mukaan tuumorilyysilääkitys (allopurinoli 300 mg p.o.1 x1 pv 1-30)

Taulukko 1. kuurin toteutus

PÄIVÄ

1.	Esilääkkeet: Deksametasoni 4 mg 2 tablettia 1 tunti ennen hoitoa Ondansetroni 8 mg 1 tabletti 1 tunti ennen hoitoa Syöpälääkehoito: Etoposidi-tiputus Karboplatiini-tiputus
2.	Esilääkkeet: - Metoklopramidi 10 mg 1 tabletti Syöpälääkehoito - Ota kotona ____ etoposidi-tablettia (Vepesid)
3.	Esilääkkeet: - Metoklopramidi 10 mg 1 tabletti

Sijainti: Keuhkosairauksien poliklinikka	Hyväksytty pvm: 27.2.2024
Hyväksyjä: Maija Peippo	Laatija: Ville Koistinen

	Syöpälääkehoito Ota kotona ___ etoposidi-tablettia (Vepesid)
19	Laboratoriokokeet (verikokeet)
21	Kuuri loppuu
22=1	Mahdollinen seuraava lääketiputus-tiputus

- Hoito kestää noin kolme tuntia.
- Tarvittavat oheislääkkeet
 - Metoklopramidi 10 mg 1 tabletti tarvittaessa 1-3 kertaa päivässä
 - Ondansetroni 8 mg 1 tabletti tarvittaessa kerran päivässä

3. Sivuvaikutukset

- Hoidon jälkeen voi ilmetä pahoinvointia, jota helpotetaan teille määrätyn lääkkeen.
- Veriarvojen muutokset voivat aiheuttaa mm. tulehduserkkyyttä, väsymystä ja suorituskyvyn laskua.
- Limakalvojen kuivuminen saattaa aiheuttaa kirvelyä ja limakalvojen rikkoutumista sekä makuaistin muutoksia.
- Hiusten oheneminen
- Ripuli, ummetus
- Ohi menevä korvien soiminen ja kuulon aleneminen on mahdollista.
- Ihottuma/kutina
- Munuaisten toiminnan heikkenemistä saattaa ilmetä turvotuksina, selkäkipuna tai virtsamäärän pienenemisenä.
- Puutumista, pistelyä, tunnottomuutta sormissa, varpaissa ja jalkapohjissa.

4. Yleistä syövän hoidosta

- Lääkäri tekee sinulle B-lausunnon Kelaan (130), jonka jälkeen saat uuden KELA-kortin. Näin saat syövän oheislääkkeet huomattavasti edullisemmin
- Solunsalpaajahoidot voivat lisätä uupumuksen ja väsymyksen tunnetta sekä aiheuttaa seksuaalista haluttomuutta.
- Liikunta ja päivittäinen ulkoilu on suositeltavaa aina voinnin salliessa.
- Hoitojen aikana voi viettää mahdollisimman normaalia elämää oman voinnin mukaan.
- Kerro voinnissasi tapahtuneista muutoksista ja mahdollisista sivuvaikutuksista sekä hoitajalle että lääkärille.
- Vältä alkoholin käyttöä. Asiasta voi keskustella vastaanotolla lääkärin kanssa.

Sijainti: Keuhkosairauksien poliklinikka	Hyväksytty pvm: 27.2.2024
Hyväksyjä: Maija Peippo	Laatija: Ville Koistinen

- D-vitamiinin ja monivitamiinitabletin käyttö on sallittua useimpien hoitojen aikana. Muiden vitamiinien käyttö on usein suotavaa tauotta. Keskustele näistä vastaanotolla.
- Useimpien luontaistuotteiden mahdollisista yhteisvaikutuksista solunsalpaajien kanssa ei ole tutkittua tietoa. Tämän vuoksi näitä on suositeltavaa välttää hoitojen aikana. Keskustele tarvittaessa asiasta lääkärin kanssa.
- Juo (vettä ja/ tai mehua) riittävästi parina päivänä hoidon jälkeen (2 l/vrk).
- Pahoinvoinnin hoidossa on tärkeää, että otat sinulle määrätyt pahoinvoinnineläkkeet. Pienten aterioiden syöminen säännöllisesti sekä kylmät ruuat saattavat helpottaa pahoinvointia.
- Jos hoitoosi liittyy kortisoni, se voi aiheuttaa närästystä, jota voidaan estää ja hoitaa vatsansuojälääkkein. Kortisoni voi lisätä myös ruokahalua, piristää ja aiheuttaa unettomuutta, nostaa verensokeria ja aiheuttaa kasvojen punoitusta.
- Muista esittää lääkärin vastaanotolla sairausloma-, todistus- ja reseptiasiat.
- Saat tarvittaessa taksitodistuksen hoidon jälkeistä kotimatkaa varten.

5. Yhteystiedot

- Mikäli sinulle tulee kysyttävää hoidosta, tai hoito aiheuttaa haittavaikutuksia, ole yhteydessä keuhkosairauksien poliklinikalle arkisin kello 8-15.
 - Keuhkolääkehoitajan puhelin: **05 220 2435**
 - Sihteerin puhelin: **05 220 2403**
- Mikäli voitisi heikkenee äkillisesti tai sinulle tulee kuumetta yli 38 astetta, ha-keudu päivystykselliseen arvioon lähimpään päivystävään sairaalaan
- Hätätapauksissa soita 112.

Sijainti: Keuhkosairauksien poliklinikka	Hyväksytty pvm: 27.2.2024
Hyväksyjä: Maija Peippo	Laatija: Ville Koistinen