

Semiplimabi (Libtayo®) -paklitakseli-karboplatiini

1. Yleistä

- Semiplimabi (Libtayo®) -paklitakseli-karboplatiini on keuhkosyövän hoitoon tarkoitettu solunsalpaajista- ja immunologisesta lääkkeestä koostuva hoito. Solunsalpaajina käytetään karboplatiinia ja paklitakselia. Semiplimabi (Libtayo®) on immunologinen lääke.
- Solunsalpaajat estävät eri tavoin syöpäsolujen kasvua tai jakautumista. Haittavaikutukset johtuvat lääkkeiden vaikutuksen kohdistumisesta myös terveisiin soluihin. Sivuvaikutukset vaihtelevat yksilöllisesti ja korjaantuvat yleensä ajan myötä solunsalpaajahoidon päättyttyä.
- Immunologinen lääke auttaa elimistön omaa puolustusjärjestelmää tunnistamaan ja tuhoamaan syöpäsoluja. Haittavaikutukset vaihtelevat yksilöllisesti. Huomioitavaa on, että haittavaikutukset voivat tulla jopa kuukausien – vuoden kuluttua hoidon päättymisestä. Haittavaikutuksia hoidetaan usein kortisonilääkityksellä.

2. Hoidon toteutus

- Aina ennen hoitoa otetaan laboratoriotestit, jotka tarkistaa lääkäri. Laboratoriotestien tarkoituksena on varmistaa, että hoito on turvallista antaa.
- Annokset ovat yksilöllisiä ja ne suunnittelee lääkäri.
- Hoito annetaan hoitokeskuksessa yleensä 3 viikon välein tiputuksena suoneen
- Yhden hoitokuurin kesto on 21 vuorokautta. Hoitopäivänä 1 annetaan syöpälääkehoito, ks. **Taulukko 1**.

Sijainti: Keuhkosairauksien poliklinikka	Hyväksytty pvm: 4.3.2024
Hyväksyjä: Maija Peippo	Laatija: Ville Koistinen

Taulukko 1. Syöpälääkehoidon toteutus

PÄIVÄ	
1.	<p>Esilääkkeet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Netupitantti-palonosetroni 300/0,5 mg (Akynteo) 1 kapseli noin 1 tunti ennen sytostaattihoitoa - Deksametasoni 4 mg 2 tablettia hoitopäivän aamuna - Famotidiini 10 mg 1 tabletti noin 1 tunti ennen hoitoa - Setiritsiini 10 mg, 1 tabletti noin 1 tunti ennen hoitoa <p>Syöpälääkehoito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semiplimabi-tiputus - Paklitakseli-tiputus - Karboplatiini-tiputus
19	Laboratoriokokeet
21	Kuuri loppuu
22=1	Mahdollinen seuraava lääketiputus-tiputus

- Yleensä annetaan 4 kertaa karboplatiini – paklitakseli – semiplimabi -yhdistelmää, minkä jälkeen hoito voi jatkua harkitusti ylläpitohoitona semiplimabilla
- Tarvittaessa kotona voi ottaa pahoinvointiin metoklopramidia 10 mg 1x1-3 suun kautta.

3. Sivuvaikutukset

- Sytostaattihoidoilla ja immunologisilla hoidoilla on hyvin erilaiset ja tyypillisesti eri aikaan ilmenevät haittavaikutukset
- Sytostaattihoidon jälkeen voi ilmetä pahoinvointia, jota helpotetaan teille määrättyin lääkkein.
 - Hiusten lähtö alkaa noin kahden viikon kuluttua ensimmäisestä hoidosta.
 - Veriarvojen muutokset voivat aiheuttaa mm. tulehduserkkyyttä, väsymystä ja suorituskyvyn laskua.
 - Limakalvojen kuivuminen saattaa aiheuttaa kirvelyä ja limakalvojen rikkoutumista.

Sijainti: Keuhkosairauksien poliklinikka	Hyväksytty pvm: 4.3.2024
Hyväksyjä: Maija Peippo	Laatija: Ville Koistinen

- Sormissa, varpaissa ja jalkapohjissa voi ilmetä puutumista, pistelyä ja tunnottomuutta.
- Iho saattaa punoittaa ja hilseillä ja kyynnet saattavat sarveistua.
- Väsymys.
- Ripuli, ummetus
- Ohimenevä kuulon aleneminen ja korvien soiminen on mahdollista.
- Immunologinen hoito saattaa aiheuttaa eri elinten tai elinjärjestelmien tulehduksellisia haittavaikutuksia tai muita ennakoimattomia haittavaikutuksia. Keskeisiä oireita ovat:
 - Infuusioreaktiot infuusion aikana tai päivän kuluessa sen jälkeen: kuume, vilunväristykset, hengästyneisyys, kasvojen ja kaulan punoitus
 - Keuhkot/sydän: hengenahdistus, yskä, rintakipu, epätavallinen sydämen syke, sydämen tiheälyöntisyys
 - Suolisto: ripuli, veriuloste, lima ulosteessa, vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu
 - Maksa: kipu vatsan oikealla puolella, ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus, väsymys
 - Munuaiset: Virtsanmäärän- tai värin muutokset
 - Hormoneja erittävät rauhaset: nopea tai epätavallinen sydämen syke, painon muutokset, hiustenlähtö, paleleminen, ummetus, äänen madaltuminen, lihassäryt, heitehuimaus tai pyörtyminen, päänsärky, hikoilu
 - Kilpirauhasen toimintahäiriöt
 - Diabetes: voimakas janon ja nälän tunne, painon lasku, tihentynyt virtsaamisen tarve, väsymys, heikotus, uneliaisuus, masennus, ärtyisyys
 - Iho: ihottuma, kutina, rakkulanmuodostus, hilseily, haavaumat limakalvoilla
 - Lihakset: kipu, heikkous, jäykkyys
 - Muut oireet: silmän kipu tai punoitus, ruoansulatushäiriöt ja närästys, käsien ja jalkojen kihelmöinti tai tunnottomuus tai kävelyvaikeudet, kuume, turvonneet imusolmukkeet.
 - Oireet tulehduksesta aivoissa: päänsärky, kuume, kouristukset, niskan jäykkyys, väsymys, sekavuus, heikkous tai uneliaisuus.

4. Yleistä syövän hoidosta

- Jos infuusion annon jälkeen on päänsärkyä, lämpöilyä, vilunväristyksiä, voi ottaa kuumetta alentavaa lääkettä.
- Solunsalpaajahoidot voivat lisätä uupumuksen ja väsymyksen tunnetta sekä aiheuttaa seksuaalista haluttomuutta.
- Hoitojen aikana voi viettää mahdollisimman normaalia elämää oman voinnin mukaan.
- Liikunta ja päivittäinen ulkoilu ovat suositeltavia aina voinnin salliessa
- Kerro voinnissasi tapahtuneista muutoksista ja mahdollisista sivuvaikutuksista sekä hoitajalle että lääkärille.

Sijainti: Keuhkosairauksien poliklinikka	Hyväksytty pvm: 4.3.2024
Hyväksyjä: Maija Peippo	Laatija: Ville Koistinen

- Vältä alkoholin käyttöä. Asiasta voi keskustella vastaanotolla lääkärin kanssa.
- D-vitamiinin ja monivitamiinitabletin käyttö on sallittua useimpien hoitojen aikana. Muiden vitamiinien käyttö on usein suotavaa tauottaa. Keskustele näistä vastaanotolla.
- Useimpien luontaistuotteiden mahdollisista yhteisvaikutuksista hoidon kanssa ei ole tutkittua tietoa. Tämän vuoksi näitä on suositeltavaa välttää. Keskustele tarvittaessa asiasta lääkärin kanssa.
- Juo (vettä ja/ tai mehua) riittävästi parina päivänä hoidon jälkeen (2 l/vrk).
- Immunologiseen lääkkeeseen ei yleensä liity pahoinvointia.
- Muista esittää lääkärin vastaanotolla sairausloma-, todistus- ja reseptiasiat.
- Saat tarvittaessa taksitodistuksen hoidon jälkeistä kotimatkaa varten.
- On tärkeää kertoa esimerkiksi terveyskeskus- tai päivystyslääkärille että, saat tai olet saanut immunoterapia- ja sytostaattihoitoa, jotta hän voi ottaa sen huomioon arvioidessaan jatkohoitoasi.

5. Yhteystiedot

- Mikäli sinulle tulee kysyttävää hoidosta, tai hoito aiheuttaa haittavaikutuksia, ole yhteydessä keuhkosairauksien poliklinikalle arkisin kello 8-15.
 - Keuhkolääkehoitajan puhelin: **05 220 2435**
 - Sihteerin puhelin: **05 220 2403**
- Mikäli voitisi heikkeneä äkillisesti tai sinulle tulee kuumetta yli 38 astetta, hakeudu päivystykselliseen arvioon lähimpään päivystävään sairaalaan
- Häätätapauksissa soita 112.

Sijainti: Keuhkosairauksien poliklinikka	Hyväksytty pvm: 4.3.2024
Hyväksyjä: Maija Peippo	Laatija: Ville Koistinen