

Alektinibi (Alecensa®) syövän hoitoon

1. Yleistä

- Alektinibi (Alecensa®) on ALK-positiiviseen keuhkosyöpään tarkoitettu tablettimuotoinen syöpälääke
- ALK-keuhkosyövässä 2 geeniä on yhdistyneet ja muodostavat niin sanotun fuusiogeenin, joka aiheuttaa syövän etenemisen
- Alektinibi on kallis lääke ja siihen tarvitaan B-lausunto, jonka pohjalta Kela antaa sinulle Korvattavuuden. Saat uuden KELA-kortin.

2. Hoidon toteutus

- Ennen hoitoa sinulta tarkistetaan laboratoriotulokset
- Lääkkeen aloittamisen jälkeen laboratoriotulokset tarkistetaan yleensä 1 ja 2 viikon päästä aloituksesta. Ensimmäinen seurantakäynti järjestetään noin 1kk kuluttua lääkehoidon aloittamisesta.
- **Annostelu: Ota Alecensa 150 mg 4 tablettia aamulla ja 4 tablettia illalla säännöllisesti joka päivä**
- Kapselit otetaan ruoan kanssa, eikä niitä saa avata tai liuottaa
- Ota tabletit aina SAMAAAN AIKAAN
- Seuraa alkuun sykettä kerran päivässä ensimmäisten hoitoviikkojen aikana

3. Sivuvaikutukset

- Tyypillisimmät haittavaikutukset ovat:
 - Lab.kokeissa mm. anemia, maksa-arvojen ja CK-arvon nousu
 - Sykkeen hidastuminen
 - Keuhkoreaktio
 - Valoyliherkkyys (aurinkorasvan käyttö!)
 - Ummetus tai ripuli
 - Turvotukset raajoissa tai silmien ympärillä
 - Lihassäryt

Sijainti: Keuhkosairauksien poliklinikka	Hyväksytty pvm: 22.2.2024
Hyväksyjä: Maija Peippo	Laatija: Ville Koistinen

4. Yleistä syövän hoidosta

- Lääkäri tekee sinulle B-lausunnon Kelaan, jonka jälkeen saat uuden KELA-kortin. Tämä oikeuttaa syövän hoidossa käytettävien lääkkeiden korvattavuuteen.
- Liikunta ja päivittäinen ulkoilu on suositeltavaa aina voinnin salliessa.
- Hoitojen aikana pitää viettää mahdollisimman normaalia elämää oman voinnin mukaan.
- Kerro voinnissasi tapahtuneista muutoksista ja mahdollisista sivuvaikutuksista sekä hoitajalle että lääkärille.
- Vältä alkoholin käyttöä. Asiasta voi keskustella vastaanotolla lääkärin kanssa.
- D-vitamiinin ja monivitamiinitabletin käyttö on sallittua useimpien hoitojen aikana. Muiden vitamiinien käyttö on usein suotavaa tauotta. Keskustele näistä vastaanotolla.
- Useimpien luontaistuotteiden mahdollisista yhteisvaikutuksista syöpälääkehoitojen kanssa ei ole tutkittua tietoa. Tämän vuoksi näitä on suositeltava välttämään hoitojen aikana. Keskustele tarvittaessa asiasta lääkärin kanssa.
- Pahoinvoinnin hoidossa on tärkeää, että otat sinulle määrätyt pahoinvoinnineläkkeet. Pienten aterioiden syöminen säännöllisesti sekä kylmät ruuat saattavat helpottaa pahoinvointia.
- Jos hoitoosi liittyy kortisoni, se voi aiheuttaa närästystä, jota voidaan estää ja hoitaa vatsansuojalääkkein. Kortisoni voi lisätä myös ruokahalua, piristää ja aiheuttaa unettomuutta, nostaa verensokeria ja aiheuttaa kasvojen punoitusta.
- Muista esittää lääkärin vastaanotolla sairausloma-, todistus- ja reseptiasiat.
- Saat tarvittaessa taksitodistuksen hoidon jälkeistä kotimatkaa varten.

5. Yhteystiedot

- Mikäli sinulle tulee kysyttävää hoidosta, tai hoito aiheuttaa haittavaikutuksia, ole yhteydessä keuhkosairauksien poliklinikalle arkisin kello 8-15.
 - Keuhkolääkehoitajan puhelin: **05 220 2435**
 - Sihteerin puhelin: **05 220 2403**
- Mikäli voitisi heikkeneä äkillisesti tai sinulle tulee kuumetta yli 38 astetta, hakeudu päivystykselliseen arvioon lähimpään päivystävään sairaalaan
- Hätätapauksissa soita 112.

Sijainti: Keuhkosairauksien poliklinikka	Hyväksytty pvm: 22.2.2024
Hyväksyjä: Maija Peippo	Laatija: Ville Koistinen