

Atetsolitsumabi (Tecenteriq®)

1. Yleistä

- Lääkehoito koostuu immunologisesta lääkkeestä nimeltä atetsolitsumabi eli Tecentriq
- Immunologinen lääke auttaa elimistön omaa puolustusjärjestelmää tunnistamaan ja tuhoamaan syöpäsoluja. Haittavaikutukset vaihtelevat yksilöllisesti. Huomioitavaa on, että haittavaikutukset voivat tulla jopa kuukausien - vuoden kuluttua hoidon päättymisestä. Lieviä haittoja seurataan lääkehoidotta. Vaikeampia haittavaikutuksia hoidetaan usein kortisonilääkityksellä.

2. Hoidon toteutus

- Ennen jokaista hoitokertaa otetaan laboratoriokokeet, joiden tulokset tarkastaa lääkäri, että ne ovat kunnossa hoitoa varten. Laboratoriokokeiden tarkoituksena on varmistaa, että hoito on turvallista antaa
- Hoito annetaan hoitokeskuksessa yleensä 3 viikon välein tiputuksena suoneen tai hitaana injektiona ihon alle reiteen.
- Yhden kuurin kesto on 21 vuorokautta. Hoitopäivänä 1 annetaan syöpälääkehoito ks. **Taulukko 1.**

Taulukko 1. Syöpälääkehoidon toteutus

PÄIVÄ	
1.	Atetsolitsumabi-tiputus / injektio
19	Laboratoriokokeet
21	Kuuri loppuu
22=1	Mahdollinen seuraava atetsolitsumabi-hoito

- Hoito kestää noin tunnin
- Hoitoon ei liity esilääkitystä

3. Sivuvaikutukset

- Hoito saattaa aiheuttaa elimistössä erilaisia tulehduksellisia haittavaikutuksia tai muita ennakoimattomia oireita.

Sijainti: Keuhkosairauksien poliklinikka	Hyväksytty pvm: 22.2.2024
Hyväksyjä: Maija Peippo	Laatija: Ville Koistinen

- Infuusioreaktiot infuusion aikana tai 1 päivän kuluessa sen jälkeen: kuume, vilunväristykset, hengästyneisyys, kasvojen ja kaulan punoitus
- Myöhemmin voi ilmetä
 - Keuhkot/sydän: hengenahdistus, rintakipu, yskä, väsymys
 - Suolisto: ripuli, veriuloste, vatsakipu
 - Maksa, haima: pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, vatsakipu, ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus, virtsan tumma väri, verenvuotoalttius, mustelmat
 - Hormoneja erittävät rauhaset: painon muutokset, hiustenlähtö, paleleminen, ummetus, heitehuimaus, väsymys, mielialan vaihtelu, tavanomaista voimakkaampi nälän ja janon tunne, tihentynyt virtsaamisentarve, lisääntynyt herkkyys kylmälle ja kuumalle
 - Aivot: niskajäykkyys, päänsärky, kuume, vilunväristykset, oksentelu, silmien valonarkuus, sekavuus, uneliaisuus
 - Hermosto: vaikea-asteinen lihasheikkous ja tunnottomuus, käsien ja jalkaterien kihelmöinti

4. Yleistä syövän hoidosta

- Lääkäri tekee sinulle B-lausunnon Kelaan (130), jonka jälkeen saat uuden KELA-kortin. Näin saat syövän oheislääkkeet, kuten pahoinvointi- ja kipulääkkeet huomattavasti edullisemmin
- Jos infuusion annon jälkeen on päänsärkyä, lämpöilyä tai vilunväristyksiä voi ottaa kuumetta alentavaa lääkettä.
- Hoitojen aikana pitää viettää mahdollisimman normaalia elämää oman voinnin mukaan.
- Liikunta ja päivittäinen ulkoilu ovat suositeltavia aina voinnin salliessa
- Kerro voinnissasi tapahtuneista muutoksista ja mahdollisista sivuvaikutuksista sekä keuhkolääkehoitajalle että lääkärille.
- Vältä alkoholin käyttöä. Asiasta voi keskustella vastaanotolla lääkärin kanssa.
- D-vitamiinin ja monivitamiinitabletin käyttö on sallittua useimpien hoitojen aikana. Muiden vitamiinien käyttö on usein suotavaa tauotta. Keskustele näistä vastaanotolla.
- Useimpien luontaistuotteiden mahdollisista yhteisvaikutuksista hoidon kanssa ei ole tutkittua tietoa. Tämän vuoksi näitä on suositeltavaa välttää. Keskustele tarvittaessa asiasta lääkärin kanssa.
- Juo (vettä ja/ tai mehua) riittävästi parina päivänä hoidon jälkeen (2 l/vrk).
- Immunologiseen hoitoon ei yleensä liity pahoinvointia.
- Muista esittää lääkärin vastaanotolla sairausloma-, todistus- ja reseptiasiat.
- Saat tarvittaessa taksitodistuksen hoidon jälkeistä kotimatkaa varten.

Sijainti: Keuhkosairauksien poliklinikka	Hyväksytty pvm: 22.2.2024
Hyväksyjä: Maija Peippo	Laatija: Ville Koistinen

- On tärkeää kertoa esimerkiksi terveyskeskus- tai päivystyslääkärille että, saat tai olet saanut immunoterapiahoitoa, jotta hän voi ottaa sen huomioon arvioidessaan jatkohoitoasi.

5. Yhteystiedot

- Mikäli sinulle tulee kysyttävää hoidosta, tai hoito aiheuttaa haittavaikutuksia, ole yhteydessä keuhkosairauksien poliklinikalle arkisin kello 8-15.
 - Keuhkolääkehoitajan puhelin: **05 220 2435**
 - Sihteerin puhelin: **05 220 2403**
- Mikäli voitisi heikkenee äkillisesti tai sinulle tulee kuumetta yli 38 astetta, hakeudu päivystykselliseen arvioon lähimpään päivystävään sairaalaan
- Hätätapauksissa soita 112.

Sijainti: Keuhkosairauksien poliklinikka	Hyväksytty pvm: 22.2.2024
Hyväksyjä: Majja Peippo	Laatija: Ville Koistinen