

Suojautuminen hengitystieinfektioilta asumispalveluyksiköissä

Asukas, jolla ei tiedossa hengitystieinfektiota

Asukas, jolla hengitystieinfektion oireet

RSV

Covid19

Influenssa

Suojaimet

Tavanomaisten varotoimien mukaan. Roiskevaaratilanteissa suojaesiliina, suojakäsineet ja visiiri.

Pisaravarotoimien mukaan. Kirurginen suu-nenäsuojain, visiiri ja tarvittaessa lähihoidossa suojaesiliina ja suojakäsineet. Voimakasoireisten asukkaiden kanssa ja aerosoleja tuottavissa toimenpiteissä FFP2/3 -hengityksensuojain.

Varotoimien kesto

Tavanomaiset varotoimet aina käytössä

Otetaan pocABRCV-näyte (22360). Jos negatiivinen, niin kunnes oireet helpottaneet

5-7vrk oireiden alusta

5-10vrk oireiden alusta, 2vrk lieväoireista ennen purkua

5vrk oireiden alusta tai 3vrk Tamiflu-lääkityksen aloituksesta

Käsihygienia

Kädet desinfioidaan ennen ja jälkeen asukkaan tai hänen lähiympäristönsä koskemisen, ennen aseptista toimenpidettä, eritteiden käsittelyn jälkeen sekä ennen suojakäsineiden pukemista ja riisumisen jälkeen. Kädet pestään vedellä ja saippualla wc-käynnin jälkeen, ennen ruokailua, kun kädet ovat näkyvästi likaiset sekä oksentavien ja ripuloivien asukkaiden hoitamisen jälkeen. Asukkaiden käsidesinfektio ohjatusti ennen ruokailua ja wc-käynnin jälkeen.

Yski ja niistä oikein

Yski hihaan, nenäliinaan tai kynnärtaipeeseen. Tämän jälkeen desinfioi kätesi. Niistä kertakäyttöiseen nenäliinaan, joka laitetaan roskeen heti käytön jälkeen. Desinfioi kätesi.