

Syyhyn lääkehoito

Syyhyn hoitoon on 4 eri valmistevaihtoehtoa

Bentsyylibentsoaatti/disulfiraami voide (Tenutex®) on ensisijainen paikallishoitovalmiste, 2 hoitokertaa 7-10 päivän välein. Vaikutusaika 24h.

Permetriinivoide (Nix® 5 %) 2 hoitokertaa 7-10 päivän välein (hoitaa noin 50 % infektioista). Vaikutusaika 12h.

Rikki-vaseliini voide (hoitovaste oletettavasti parempi kuin permetriinivoiteella). Vaikutusaika 12-24h, levitetään kolmen päivän ajan. 2 hoitokertaa 7-10 päivän välein.

Kirjoitetaan ex-tempore valmisteena. LC:ssa on olemassa valmis ex tempore pohja "rikki 10%-vaseliini, voide". Resepti muutetaan, jos kyseessä on lapsipotilas 6%-vaseliini voide ja vaikuttavan aineen Sulfur määrä on 6.0.

Hoito voidaan aloittaa myös suoraan **ivermektiini 3mg po tablettihoidolla** (Scatol®) painokilojen mukaan kerta-annoksena ja hoito toistetaan 7-10 vrk kuluttua.

Ensimmäisen hoidon epäonnistuessa voidaan käyttää kombinaatiohoitona: ivermektiini 3mg p.o. painoon suhteutettuna + bentsyylibentsoaatti/disulfiraami voide (tai 10%:n rikki-vaseliinia aikuisilla ja 6% rikki-vaseliinia lapsilla tai permetriinivoide). Hoito toteutetaan 2 kertaa 7-10 pv välein.

Potilaan kaikki lähikontaktit hoidetaan aina samalla tavalla ja samaan aikaan.

RESEPTIN MUKANA POTILAALLE ANNETAAN MYÖS KIRJALLISET HOITO-OHJEET JOSSA MM. SIIVOUSOHJEET.