

Suojautuminen hengitystieinfektioilta vuodeosastoilla

	Hengitystieinfektion oireita	Adenovirus	RSV	Covid19	Influenssa A ja B
Potilaan sijoittelu	1 hengen huone		1hh tai toisen RSV:n kanssa	1hh tai toisen covid19:n kanssa	1hh tai toisen influenssan kanssa. A ja B erillään.
Varotoimien kesto	5 vrk oireiden alusta	Koko hoitojakso. Hygieniahoitajan ja tarv. infektiolääkärin konsultaatio	7vrk oireiden alusta	5-10vrk oireiden alusta, 2vrk vähempioireista ennen purkua	5vrk oireiden alusta tai 3vrk Tamiflu-lääkityksen aloituksesta
Suojaimet	Pesaravarotoimien mukaan. Kirurginen suu-nenäsuojain, visiiri ja tarvittaessa lähihoidossa suojaesiliina ja suojakäsineet. Voimakasoireisten potilaiden kanssa ja aerosoleja tuottavissa toimenpiteissä FFP2/3 -hengityksensuojain.				
Käsihygienia	Kädet desinfioidaan ennen ja jälkeen potilaan tai hänen lähiympäristönsä koskemisen, ennen aseptista toimenpidettä, eritteiden käsittelyn jälkeen sekä ennen suojakäsineiden pukemista ja riisumisen jälkeen. Kädet pestään vedellä ja saippualla wc-käynnin jälkeen, ennen ruokailua, kun kädet ovat näkyvästi likaiset sekä oksentavien ja ripuloivien potilaiden hoitamisen jälkeen. Potilaiden käsien desinfektio ohjatusti ennen ruokailua ja wc-käynnin jälkeen.				
Yski ja niistä oikein	Yski hihaan, nenäliinaan tai kynärtaipeeseen. Tämän jälkeen desinfioi kätesi. Niistä kertakäyttöiseen nenäliinaan, joka laitetaan roskeen heti käytön jälkeen. Desinfioi kätesi.				