

Respiratorista virusinfektiota sairastavan varotoimet

	Oireinen, aiheuttaja ei tiedossa tai testitulos kesken	Adenovirus	RSV	Covid19	Influenssa A ja B
Potilaan sijoittelu	1 hengen huone		1hh tai kohortti		1hh tai kohortti. A ja B erillään.
Varotoimien kesto	5 vrk oireiden alusta	Koko hoitojakso. Hygieniahoitajan ja tarv. infektiolääkärin konsultaatio	5vrk oireiden alusta, lapset 10 vrk	5 vrk oireiden alusta, 2vrk vähempioireista ennen purkua	5vrk oireiden alusta tai 3vrk Tamiflu-lääkityksen aloituksesta
Suojaimet	Pisaravarotoimien mukaan. Kirurginen suu-nenäsuojain, visiiri ja tarvittaessa lähihoidossa suojaesiliina ja suojakäsineet. Voimakasoireisten potilaiden kanssa ja aerosoleja tuottavissa toimenpiteissä FFP2/3 -hengityksensuojain.				
Käsihygienia	Kädet desinfioidaan ennen ja jälkeen potilaan tai hänen lähiympäristönsä koskemisen, ennen aseptista toimenpidettä, eritteiden käsittelyn jälkeen sekä ennen suojakäsineiden pukemista ja riisumisen jälkeen. Kädet pestään vedellä ja saippualla wc-käynnin jälkeen, ennen ruokailua, kun kädet ovat näkyvästi likaiset sekä oksentavien ja ripuloivien potilaiden hoitamisen jälkeen. Potilaiden käsien desinfektio ohjatusti ennen ruokailua ja wc-käynnin jälkeen.				
Yski ja niistä oikein	Yski hihaan, nenäliinaan tai kynärtaipeeseen. Tämän jälkeen desinfioi kätesi. Niistä kertakäyttöiseen nenäliinaan, joka laitetaan roskeen heti käytön jälkeen. Desinfioi kätesi.				